



This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This document is not intended as a substitute for the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38.

IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a public or private elementary or secondary school in Texas.

Vaccine Required (Attention to notes and footnotes)	Minimum Number of Doses Required by Grade Level				***NOTES***
	PPCD, ECAP, Community, Speech & PK	K – 6th	7th	8th-12th	
Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) ¹	4 doses	5 doses or 4 doses	3 dose primary series and 1 booster dose of Tdap /Td within the last 5 years	3 dose primary series and 1 booster dose of Tdap /Td within the last 10 years	<p>For K – 6th grade: 5 doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; 1 dose must have been received on or after the 4th birthday. However, 4 doses meet the requirement if the 4th dose was received on or after the 4th birthday.¹ For students aged 7 years and older, 3 doses meet the requirement if 1 dose was received on or after the 4th birthday.¹</p> <p>For 7th grade: 1 dose of Tdap is required if at least 5 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.*</p> <p>For 8th – 12th grade: 1 dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.*</p> <p>*Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.</p>
Polio ¹	3 doses	4 doses or 3 doses			<p>For K – 12th grade: 4 doses of polio; 1 dose must be received on or after the 4th birthday.¹ However, 3 doses meet the requirement if the 3rd dose was received on or after the 4th birthday.¹</p>
Measles, Mumps, and Rubella ^{1,2} (MMR)	1 dose	2 doses			<p>For K – 12th grade: 2 doses are required, with the 1st dose received on or after the 1st birthday.¹ Students vaccinated prior to 2009 with 2 doses of measles and one dose each of rubella and mumps satisfy this requirement.</p>
Hepatitis B ²	3 doses				<p>For students aged 11 – 15 years, 2 doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax[®]) was received. Dosage (10 mcg /1.0 mL) and type of vaccine (Recombivax[®]) must be clearly documented. If Recombivax[®] was not the vaccine received, a 3-dose series is required.</p>
Varicella ^{1,2,3}	1 dose	2 doses			<p>For K – 12th grade: 2 doses are required, with the 1st dose received on or after the 1st birthday.¹</p>
Meningococcal (MCV4) ¹			1 dose		<p>For 7th – 12th grade, 1 dose of quadrivalent meningococcal conjugate vaccine is required on or after the student's 11th birthday.</p> <p>NOTE: If a student received the vaccine at 10 years of age, this will satisfy the requirement.</p>
Hepatitis A ²	2 doses				<p>For K – 11th grade: 2 doses are required, with the 1st dose received on or after the 1st birthday.¹</p>
Haemophilus influenzae type B (Hib)	3 doses				<p>A complete Hib series is two doses plus a booster dose on or after 12 months of age (three doses total). If a child receives the first dose of Hib vaccine at 12-14 months of age, only one additional dose is required (two doses total). Any child who has received a single dose of Hib vaccine on or after 15 months of age is in compliance with these specified vaccine requirements.</p>
Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV-7, PCV-13)	4 doses				<p>If the PCV series is started when a child is seven months of age or older or the child is delinquent in the series, then all four doses may not be required. Children 24 months through 59 months meet the requirement if they have at least three doses with one dose on or after 12 months of age, or two doses with both doses on or after 12 months of age, or one dose on or after 24 months of age. Otherwise, one additional dose is required.</p>

RECOMMENDED IMMUNIZATIONS 2020-2021

Vaccine	# of Doses	Minimum Age	Notes
HPV9- 2-dose schedule (0, 6-12 months) of 9-valent HPV vaccine for use in girls and boys age 9-14 years	2-3	<p>9- 14 years of age at initiation</p> <p>15 years or older at initiation</p>	<p>Routine vaccination for girls and boys at age 11 or 12 years. The vaccination series can be started at age 9 years. CDC also recommends vaccination through age 26 years for females and through age 21 years for males. Males age 22-26 years may be vaccinated. Number of doses dependent on age at initial vaccination</p> <p>2-dose HPV vaccination schedule For girls and boys starting the vaccination series before the 15th birthday, the recommended schedule is 2 doses of HPV vaccine. The second dose should be given 6-12 months after the first dose (0, 6-12 month schedule).</p> <p>3-dose HPV schedule 3-dose schedule for persons starting the HPV vaccination series on or after the 15th birthday, and for persons with certain immunocompromising conditions. The second dose should be given 1-2 months after the first dose, and the third dose should be given 6 months after the first dose (0, 1-2, 6 month schedule).</p>
Influenza, (seasonal)		Minimum 6 months of age and annually thereafter	All children every year starting at minimum age of 6 months for recommended injectable influenza vaccines (including inactivated influenza vaccines and recombinant influenza vaccines).

NOTE: Shaded area indicates that the vaccine is not required for the respective age group.

¹Receipt of the dose up to (and including) 4 days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.

²Serologic evidence of infection or serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella is acceptable in place of vaccine.

³Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of student) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." This written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.

Exemptions

Texas law allows (a) physicians to write medical exemption statements that the vaccine(s) required would be medically harmful or injurious to the health and well-being of the child or household member, and (b) parents/guardians to choose an exemption from immunization requirements for reasons of conscience, including a religious belief. The law does not allow parents/guardians to elect an exemption simply because of inconvenience (for example, a record is lost or incomplete and it is too much trouble to go to a physician or clinic to correct the problem). Schools should maintain an up-to-date list of students with exemptions, so they may be excluded in times of emergency or epidemic declared by the commissioner of public health.

Instructions for requesting the official exemption affidavit that must be signed by parents/guardians choosing the exemption for reasons of conscience, including a religious belief, can be found at www.ImmunizeTexas.com under "School & Child-Care." Original Exemption Affidavit must be completed and submitted to the school.

For children claiming medical exemptions, a written statement by the physician must be submitted to the school. Unless it is written in the statement that a lifelong condition exists, the exemption statement is valid for only one year from the date signed by the physician.

Provisional Enrollment

All immunizations should be completed by the first date of attendance. The law requires that students be fully vaccinated against the specified diseases. A student may be enrolled provisionally if the student has an immunization record that indicates the student has received at least one dose of each specified age- appropriate vaccine required by this rule. To remain enrolled, the student must complete the required subsequent doses in each vaccine series on schedule and as rapidly as is medically feasible and provide acceptable evidence of vaccination to the school. A school nurse or school administrator shall review the immunization status of a provisionally enrolled student every 30 days to ensure continued compliance in completing the required doses of vaccination. If, at the end of the 30-day period, a student has not received a subsequent dose of vaccine, the student is not in compliance and the school shall exclude the student from school attendance until the required dose is administered. Additional guidelines for provisional enrollment of students transferring from one Texas public or private school to another, students who are dependents of active duty military, students in foster care, and students who are homeless can be found in the TAC, Title 25 Health Services, Sections 97.66 and 97.69.

Documentation

Since many types of personal immunization records are in use, any document will be acceptable provided a physician or public health personnel has validated it.

The month, day, and year that the vaccination was received must be recorded on all school immunization records created or updated after September 1, 1991.



**REQUISITOS MÍNIMOS DE VACUNAS EN EL ESTADO DE TEXAS PARA 2020 – 2021
PARA ESTUDIANTES DE KÍNDER A 12.º GRADO**



Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. Este documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código Educativo de Texas, capítulo 38, concede al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida (Vea las notas y las notas de pie de página)	Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado			***NOTAS***	
Difteria, tétanos, tosferina (DTaP, DTP, DT, Td, Tdap) ¹	PPCD, ECAP, Community, Speech & PK	Kínder – 6.º	7.º	8.º – 12.º	Para los grados kínder a 6.º: 5 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina; debe haberse recibido 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 4 dosis se cubre el requisito si la 4.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños. 1 Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con 3 dosis cumplen con el requisito si recibieron 1 de las dosis en o después del 4.º cumpleaños. ¹ Para el 7.º grado: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos. * Para los grados 8.º a 12.º: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap cuando hayan pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos. * *La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica para la vacuna contra la tosferina.
	4 dosis	5 dosis o 4 dosis	Una serie primaria de 3 dosis y 1 refuerzo de la vacuna Tdap / Td en los últimos 5 años	Una serie primaria de 3 dosis y 1 refuerzo de la vacuna Tdap / Td en los últimos 10 años	
Polio ¹	3 dosis	4 dosis o 3 dosis		Para los grados kínder a 12.º: 4 dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 3 dosis se cumple con el requisito si la 3.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños. ¹	
Sarampión, paperas y rubeola ^{1,2} (MMR)	1 dosis	2 dosis		Para los grados kínder a 12.º: Se requieren 2 dosis de la vacuna, la 1.ª de las cuales debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños. Los estudiantes que fueron vacunados antes de 2009 con 2 dosis contra el sarampión y una dosis contra la rubeola y una dosis contra las paperas cumplen con este requisito.	
Hepatitis B ²	3 dosis			Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con 2 dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). Tanto la dosis (10 mcg / 1.0 mL) como el tipo de vacuna (Recombivax®) deben documentarse claramente. Si la vacuna recibida no fue Recombivax®, se requiere una serie de 3 dosis.	
Varicela ^{1,2,3}	1 dosis	2 dosis		Para los grados kínder a 12.º: Se requieren 2 dosis, de las cuales la 1.ª dosis debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños. ¹	
Vacuna antimeningocócica (MCV4) ¹			1 dosis	Para los grados 7.º a 12.º, se requiere 1 dosis de la vacuna antimeningocócica tetravalente conjugada en o después del 11.º cumpleaños del estudiante. Nota: Si el estudiante recibió la vacuna a los 10 años de edad, cumple con el requisito.	
Hepatitis A ²	2 dosis			Para los grados kínder a 11.º: Son necesarias 2 dosis, la 1ª de las cuales debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños. ¹	
Vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo B (Hib)	3 dosis			Una serie completa de Hib consiste en dos dosis más una dosis de refuerzo en o después de los 12 meses de edad (tres dosis en total). Si los niños reciben la primera dosis de la vacuna Hib de los 12-14 meses de edad, se requiere sólo una dosis adicional (dos dosis en total). Los niños que han recibido una dosis única de la vacuna Hib en o después de los 15 meses de edad cumplen con estos requisitos de vacunación especificados.	
Vacuna neumocócica conjugada (PCV-7, PCV-13)	4 dosis			Si se empieza la serie de PCV cuando los niños tienen siete meses de edad o más o el niño no está al día en la serie, entonces todas las cuatro dosis podrían no requerirse. Los niños de 24 meses a 59 meses de edad cumplen con el requisito si llevan al menos tres dosis con una dosis en o después de los 12 meses de edad, o dos dosis con ambas dosis en o después de los 12 meses de edad, o una dosis en o después de los 24 meses de edad. De lo contrario, se requiere una dosis adicional.	

VACUNAS RECOMENDADAS PARA 2020-2021

Vacuna	Dosis	Edad mínima	Notas
HPV9- 2 dosis (0, 6 a 12 meses) de la vacuna contra 9 genotipos de HPV, para varones y mujeres Edad: 9 a 14 años	2-3	9 a 14 años al momento de la dosis inicial 15 años o más al momento de la dosis inicial	Vacuna de rutina para varones y mujeres de 11 o 12 años. La serie de esta vacuna puede comenzar a los 9 años. CDC recomienda la vacuna hasta los 26 años para las mujeres, y hasta los 21 años para los varones. Los varones de 22 a 26 años también pueden recibir la vacuna. El número de dosis depende de la edad al momento de la dosis inicial. Esquema de 2 dosis de la vacuna contra el HPV Para las mujeres y los varones que comienzan a recibir esta vacuna antes de los 15 años, el esquema recomendado es de 2 dosis. La segunda dosis debe recibirse entre 6 y 12 meses después de la primera (esquema 0, 6 a 12 meses). Esquema de 3 dosis de la vacuna contra el HPV Esquema de 3 dosis para personas que comienzan a recibir esta vacuna después de cumplir los 15 años, y para las personas inmunocomprometidas. La segunda dosis de la vacuna debe recibirse entre 1 y 2 meses después de la primera, y la tercera, 6 meses después de la primera (esquema 1, 1 a 2, 6 meses).
Influenza, (temporal)		Mínimo de 6 meses de edad y todos los años a partir de la vacuna inicial	Todos los niños, todos los años a partir de la edad mínima de 6 meses para la vacuna inyectable recomendada, incluyendo las vacunas contra la influenza inactivadas y las vacunas contra la influenza recombinantes.

NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente.

¹Recibir la dosis hasta (e inclusive) 4 días antes del cumpleaños satisfará el requisito de inmunización para inscribirse en la escuela.

²Son aceptables en lugar de la vacuna una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela.

³Si se ha tenido la enfermedad previamente, puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar o uno de los padres o el tutor del niño que diga algo como: "Esto es para comprobar que (nombre del estudiante) tuvo la enfermedad de la varicela el (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela". Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de alguna o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.

Exenciones

La ley de Texas autoriza a que (a) los médicos redacten declaraciones de exención médica para una vacuna o vacunas requeridas que podrían ser médicamente dañinas o perjudiciales para la salud y el bienestar del niño o de un miembro del hogar, y (b) los padres o tutores opten por una exención de los requisitos de inmunización por razones de conciencia, incluso por creencias religiosas. La ley no permite que los padres o tutores opten por una exención simplemente por incomodidad (por ejemplo, cuando un registro se haya perdido o esté incompleto y sea mucha molestia ir con un médico o una clínica a corregir el problema). Las escuelas deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir en casos de emergencias o epidemias declaradas por el director de salud pública.

Encontrará las instrucciones para solicitar la declaración jurada de exención oficial que debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la exención por razones de conciencia, incluso por creencias religiosas, en www.ImmunizeTexas.com en el enlace para "Escuelas y guarderías". El original de la declaración jurada de exención debe llenarse y entregarse en la escuela.

En el caso de los niños para quienes se reclamen exenciones médicas, es necesario presentar a la escuela una declaración escrita del médico.

A menos que en la declaración conste por escrito que existe una afección de por vida, la declaración de exención es válida por solo un año a partir de la fecha en que el médico la firmó.

Inscripción provisional

Todas las inmunizaciones deben haberse completado antes de la primera fecha de asistencia. La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados contra las enfermedades específicas. Un estudiante puede inscribirse de manera provisional si cuenta con un registro de inmunización que indique que el estudiante ha recibido al menos una dosis de cada vacuna específica apropiada para su edad que esta regla exige. Para seguir inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas de cada serie de vacunas conforme al calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible, y proporcionar a la escuela un comprobante aceptable de que ha sido vacunado. Un enfermero escolar o un administrador escolar revisará el estado de inmunización de los estudiantes inscritos de manera provisional cada 30 días para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de la aplicación de las dosis de vacunas requeridas. Si, al final del periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis posterior de la vacuna, el estudiante no está cumpliendo y la escuela excluirá al estudiante para que no asista a la escuela hasta que se administre la dosis requerida. Las pautas adicionales para la inscripción provisional de estudiantes transferidos de una escuela pública o privada de Texas a otra, de estudiantes que dependen de militares en servicio activo, de estudiantes que viven en hogar de acogida y de estudiantes en situación de sin techo, se encuentran en el TAC, título 25, Servicios de salud, secciones 97.66 y 97.69.

Documentación

Dado que se usan muchos tipos de registros de inmunización personales, cualquier documento es aceptable si un médico o el personal de salud pública lo ha validado. Debe registrarse el mes, día y año en que se recibió la vacuna en todos los registros de inmunización escolares creados o actualizados después del 1 de septiembre de 1991.